



TETRAPLUS 20%

Antibacterial

Reg. ICA 7276-MV

COMPOSICIÓN:

Cada 100 g contienen:
Clortetraciclina Cálcica
Excipientes C.S.P.

20 g
100 g

INDICACIONES Y USOS:

En Aves pollo de engorde y pollas de levante para el control y tratamiento de enfermedades respiratorias crónicas (ERC), sinovitis infecciosas y enteritis infecciosas, producidas por *Escherichia coli*, *Streptococcus sp.*, *Mycoplasma sp.*, *Haemophilus sp.*, *Pasteurella sp.*, *Campylobacter sp.* En Cerdos para el tratamiento de enfermedades, producidas por *Escherichia coli*, *Pasteurella sp.*, *Campylobacter sp.*, *Streptococcus sp.*, *Mycoplasma sp.*, *Haemophilus sp.*, *Shigella sp.*

POSOLOGÍA:

En Aves, Pollo de engorde y pollas de levante: Suministrar diariamente 60 mg de ingrediente activo por kilogramo de peso vivo durante 5-7 días. En la practica administrar por tonelada de alimento según sea el caso de la siguiente forma: Tratamiento de ERC: 1.325 g a 2.625 g de producto por 5-7 días • Tratamiento de ERC y enteritis infecciosa: de 2.625 g a 5.250 g de producto • Tratamiento preventivo y curativo en sinovitis infecciosa de 2.625 g a 5.250 g de producto por 5 días.

En Cerdos administrar por tonelada de alimento según sea el caso de la siguiente forma: En enfermedades entéricas de 2.625 g a 5.250 g de producto. Tratamiento de leptospirosis 5.250 g de producto. Cerdas en gestación y lactancia de 2.625 g a 5.250 g producto por 5-7 días seguidos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral en premezcla con los alimentos.

PRECAUCIONES:

- No administrar de forma directa a los animales.
- Almacenar a temperatura ambiente.
- No administrar en ponedoras en producción cuyos huevos se destinen al consumo humano.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 15 días después de finalizado el tratamiento.

PRESENTACIÓN:

5 kg, 10kg, 25 kg.



ANTIMICROBIANO