



Agente terapéutico, eficaz en el control y tratamiento de la Coccidiosis.



AMPROGAN

Anticoccidiales

Reg. ICA 4274-DB

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contienen:

Amprolio 20,0 g
Excipientes C.S.P. 100,0 ml

AMPROGAN® es un agente terapéutico, eficaz en el control y tratamiento de la Coccidiosis; más conocida como diarrea negra o curso negro, en bovinos, ovinos y aves.

USO EN: Bovinos, Ovinos y Aves.

POSOLOGÍA:

Bovinos y Ovinos	Aves en general
10 mg/kg peso vivo. Disolver en una botella de agua, 5 g del producto (1 cucharada mediana) por cada 100 kg de peso o lo que es igual 1 g por cada 20 kg de peso. El tratamiento debe mantenerse mínimo por 5 días continuos.	200 mg/kg de peso vivo aproximadamente. Disolver una bolsa de 25 g por cada 25 litros de agua de bebida y suministrarla mínimo durante 7 días, como única fuente de agua de bebida para las aves. Se debe preparar diariamente el agua medicada. Se recomienda mantener el tratamiento durante otros 7 días disolviendo un sobre de 25 g en 100 litros de agua.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

INDICACIONES:

En aves (pollos de engorde, pollas de reemplazo y reproductoras) para el control y tratamiento de la coccidiosis por: *Eimeria tenella*, *Eimeria acervulina*, *Eimeria necatrix* y *Eimeria brunetti*. En ganado joven y adulto para carne, específicamente: En bovinos: para el tratamiento de la coccidiosis producida por: *Eimeria zuermi*. En ovinos: para el tratamiento de la coccidiosis producida por: *Eimeria ahsata* y *Eimeria ovina*.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo hasta 24 horas después de finalizado el tratamiento.

PRECAUCIONES:

No administrar en aves de postura, cuyos huevos se destinen al consumo humano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:

Caja por 25 sobres y 50 sobres por 25 g

