



**Controla las Garrapatas
Eficazmente en sus
Animales y Potreros**



ATAKAR

Ectoparasiticidas

Reg. ICA 6673-MV

CONTENIDO: Cada 100 ml contienen:
Fluazuron2,5g
(N-4-cloro-3-3-cloro-5-trifluorometil-2-
pirodiniloxifenilaminocarbonil-2,6-difluorobenzamida).
Excipientes C.S.P.100 ml

INDICACIONES: Garrapaticida bovino. El espectro de acción incluye *Boophilus microplus* (Garrapata común del bovino). Actúa interfiriendo en la formación de quitina de los insectos, interrumpiendo el ciclo de vida en diferentes estadios durante las mudas y la embriogénesis. Inhibiendo la producción de huevos o se presentan a huevos inviables. Producto de acción sistémica, que se absorbe por vía transdérmica.

POSOLÓGIA: La dosificación es de 2,5 mg/kg de peso vivo (5 ml por 50 kg).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Solución tópica que se aplica por derrame en la línea dorsal (**pour-on**). Realizar máximo 3 aplicaciones por año, (cada 4 meses) dependiendo del grado de infestación y exposición. No administrar antes de que transcurran 6 semanas del último tratamiento.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: "En caso de intoxicación accidental lleve inmediatamente el paciente al medico y proporcione una copia de esta etiqueta". No existe antídoto. El tratamiento es sintomático. "En caso de intoxicación del animal llamar al medico veterinario".

PRECAUCIONES:

- En algunos animales tratados puede aparecer una aspereza en el área de aplicación que generalmente desaparece de manera espontánea.
- El producto es irritante al entrar en contacto con ojos y piel. Utilizar Guantes.

- Cambiarse la ropa de trabajo después de aplicar el producto.
- No coma, fume o beba mientras aplica el producto.
- "En caso de intoxicación animal llamar al medico veterinario".
- CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.
- NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de ingestión no inducir el vomito. Dar a beber grandes cantidades de agua.
- Contacto con la piel, lavar con agua y jabón mínimo 15 minutos.
- Inhalación, mover el paciente al aire fresco, si no respira, dar respiración artificial, preferiblemente boca a boca, si la respiración se dificulta dar oxígeno.
- Contacto con los ojos, lavar los ojos con abundante agua, mínimo 15 minutos. Consultar al medico.

TIEMPO DE RETIRO: Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 42 días después del tratamiento. No aplicar a vacas en producción de leche destinada a consumo humano. No realizar tratamiento con este producto a hembras gestantes durante las ultimas 6 semanas de gestación.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: No contaminar depósitos o corrientes de agua con el producto o sus envases, porque es muy tóxico para los animales acuáticos. Los envases y residuos del producto deben ser dispuestos de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN: Frascos de 100, 250, 500 y 1000 ml.



ECTOPARASITICIDAS