



# CIPROVIC

Antimicrobiano

Reg. ICA 7071-MV

**COMPOSICIÓN:** Cada 100 g contienen:  
 Ciprofloxacina base (A partir de Ciprofloxacina Clorhidrato 20 g)..... 18,02 g  
 Excipientes C.S.P. .... 100,00 g

**INDICACIONES:**  
 En pollos de engorde, pollas de reemplazo y reproductoras, para el control y tratamiento de infecciones causadas por enfermedades respiratorias causadas por *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma sinoviae*, *Haemophilus paragallinarum*, *Pasteurella multocida*. Enfermedades del sistema digestivo ocasionados por *Escherichia coli*.  
 En Cerdos para el tratamiento de enfermedades gastro-intestinales y síndrome respiratorio ocasionados por *Shigella sp.*, *Pasteurella sp.*, *Escherichia coli*, *Mycoplasma sp.*, *Haemophilus sp.*, *Klebsiella sp.*, *Pseudomona sp.* y *Bordetella bronchiseptica*.

**POSOLÓGIA:**  
 Aves: Administrar 5 mg por kg de peso diario durante 3 a 5 días consecutivos. **DOSIS PRÁCTICA:** Disolver 50 g del producto en 500 litros de agua de bebida.  
 CERDOS: 10 mg/kg diario durante 3 a 5 días seguidos.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**  
 Oral, en el agua de bebida.

**PRECAUCIONES:**

- No administrar en aves en periodo de postura.
- Almacenar a temperatura ambiente.
- Preparar diariamente las medicaciones.

**TIEMPO DE RETIRO:**  
 Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 10 días después de finalizado el tratamiento.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**  
 Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

**PRESENTACIÓN:**  
 Caja 25 Sobres de 25 g,  
 Sobres de 250 g y 500 g.

