



**Tratamiento curativo de la coccidiosis,
curso negro, diarrea de sangre.**



COCCIDINA NF

Anticoccidiales

Reg. ICA 1915-DB

COMPOSICIÓN: Cada 100 g contienen:

Sulfaguanidina	20 g
Alumbre	18 g
Tanino (extracto)	24 g
Excipientes C.S.P.	100 g

USO EN:

Bovinos jóvenes, Equinos, Ovinos, Porcinos, Caninos y Aves.

INDICACIONES:

La Coccidina NF esta indicada para el tratamiento de trastornos gastrointestinales producido o complicados por los siguientes gérmenes: Pasteurella sp, Escherichia coli, Shigella sp, y Coccidias: Eimeria tenella, E. acervulina, E. necatrix, E. mivati, E. brunetti, en terneros, cabritos y borregos aún no rumiantes y en equinos, caninos y aves.

DOSIS:

Administrar por vía oral 200 mg / kg de peso Dosis practica: 4 g por 20 KPV un sobre del producto por cada 100 KPV., A mañana y tarde en media botella de agua, por un tiempo no inferior a 4 días, o según criterio del Médico Veterinario. AVES: Mezclar el contenido de un sobre en 1 kg de alimento por dos días. En coccidiosis severas conti-

nuar el tratamiento por 3 a 5 días.

PRECAUCIONES:

No administrar a ponedoras en producción de huevo para consumo humano.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 5 días después de finalizado el tratamiento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:

Caja de 5 sobres por 20 g cada uno.

