



# FIPRO SPRAY

Ectoparasiticidas

Reg. ICA 7497-MV



## COMPOSICIÓN:

Cada ml contiene:  
Fipronil ..... 2,5 mg  
Excipientes C.S.P. .... 1 ml

**INDICACIONES:** Indicado para controlar y tratar la infestación por pulgas (*Ctenocephalides sp.*) garrapatas (*Rhipicephalus sp.*, *Ixodes sp.*, *Dermacentor sp.*) y piojos (*Trichodectes sp.*, *Felicola sp.*) en perros y gatos. Ayuda al control de la Dermatitis Alergica producida por picadura de pulga (DAPP).

**POSOLÓGIA:** Para mojar la raíz de los pelos, aplicar 3 a 6 ml por kg de peso, dependiendo del tamaño del pelo (7,5 a 15 mg de producto activo por kg), osea: 2 a 4 chorros por kg de peso (frasco 250 ml), 1,5 ml c/chorro. El producto es activo hasta 3 meses contra pulgas y 5 semanas contra garrapatas, según el parásito presente en el medio ambiente del animal.

**MÉTODO DE APLICACIÓN:** Aplicar sobre el pelo del animal desde una distancia de aproximadamente 10-20 cm, según la posología indicada. En animales de pelo largo, apartar el pelo y aplicar el producto a contra pelo, hasta el nacimiento de los pelos. Friccionar el pelo para que el producto penetre la piel. Dejar secar naturalmente. No sequen con una toalla.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Uso externo, mediante aplicación tópica.

**PERIODO DE PROTECCIÓN:** Contra pulgas: Perros: 2-3 meses.  
• Gatos: 40 días. Contra garrapatas: 1 mes (3-5 semanas).

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- No aplicar en perros menores de 8 (ocho) semanas de edad.
- Aplicar el producto en un lugar bien ventilado.
- Evitar aplicar el producto en los ojos del animal.
- Usar guantes, especialmente durante el tratamiento de un grupo de animales.
- Lavarse las manos después de usar el producto.
- No fumar, beber, o comer durante la aplicación.
- Conserve alejado del calor (producto inflamable).

**OBSERVACIONES:** Para evitar la reinfestación y controlar con eficacia las pulgas y las garrapatas, es importante tratar también el medio ambiente en donde viven perros y gatos usando los productos adecuados para ello.

**PRIMEROS AUXILIOS:** • En caso de contacto con los ojos y/o piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón durante quince minutos. • En caso de INGESTIÓN e intoxicación, beber grandes cantidades de agua; acuda al Médico y muestrele una copia de ésta etiqueta. En caso de intoxicación animal, llamar al Médico Veterinario.

**RECOMENDACIONES:** • No bañar al animal dentro de las 48 horas anteriores y posteriores al tratamiento. • No contaminé depósitos o corrientes de agua con el producto o sus envases vacíos, porque puede afectar adversamente los organismos acuáticos, cualquier contenido residual debe ser dispuesto acorde a la normatividad ambiental vigente.

**ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico debe suministrar tratamiento sintomático.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

**PRESENTACIÓN:** Frasco de 50, 100 y 250 ml.



ECTOPARASITICIDAS