



Para el tratamiento  
en la deficiencia del Calcio.



# HEMATURINA

Calcio y Preraciones

Reg. ICA 2673-DB

**COMPOSICIÓN:** Cada sobre de 10 g contienen:  
Fosfato de Calcio dibásico ..... 7 g  
(Aporta 2,06g de lon calcio)  
Calcio gluconato ..... 1,75 g  
(Aporta 0,16g de lon calcio)  
Calcio carbonato ..... 0,75 g  
(Aporta 0,30g de lon calcio)  
Excipientes C.S.P..... 10 g

**USO EN:** Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos Caninos, Gatos y Aves.

**INDICACIONES:**

Coadyuvante en el tratamiento de las deficiencias de calcio en aves, bovinos, caninos, equinos, gatos, ovinos y porcinos.

**EN AVES:** Indicación primordialmente en cuadros con marcada deficiencia de calcio. De 2 a 2,5 g por 100 Kg de peso vivo; en la práctica realizar dos choques semanales (cada tercer día) de 2 g por 100 kg de peso vivo.

**DOSIFICACIÓN:**

El tratamiento se recomienda establecerlo por (5) días consecutivos o a criterio del Médico Veterinario. Solubilizar la dosis adecuada de Hematurina en agua de bebida de acuerdo a la especie y el peso del animal.

ESPECIE	CANTIDAD	EQUIVALENCIA
Bovinos, Ovinos Porcinos	10 g / 100 kg PV día	1 sobre
Caninos adultos	2 g / 10 kg PV día	1 cucharadita dulcera
Caninos juvenes	1 g / 5 kg PV día	1/2 cucharadita dulcera
Gatos	1 g / 5 kg PV día	1/2 cucharadita dulcera

**FORMA DE USO:**

En el agua después de las cuatro de la tarde la frecuencia depende del restablecimiento de la cáscara

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Administrar por vía oral

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

**PRESENTACIÓN:**

Caja dispensador por 25 sobres de 10 g cada uno.

