

“EI ANTIHISTAMÍNICO DE ACCIÓN RÁPIDA, EFICAZ Y SEGURA”



HISTAVET 2.5%

Analgésicos / Anti-inflamatorios

Reg. ICA 10963-MV

COMPOSICIÓN GARANTIZADA: Cada mL de solución inyectable contienen:
Difenhidramina Clorhidrato 25 mg
Excipientes c.s.p. 1 mL

MECANISMO DE ACCIÓN: HISTAVET 2.5%, actúa bloqueando la histamina, que es una sustancia en el cuerpo que causa los síntomas de la alergia.

La histamina es un neurotransmisor que se ubica en las neuronas, pero también es un compuesto químico que se localiza en el interior de las células del sistema inmunológico, en la sangre y en el estómago, para producir efectos cuando el organismo cree que está siendo atacado por sustancias nocivas. (Agentes alergizantes)

La histamina se encarga de activar los síntomas y procesos que nos indican que existe una alergia. (Síntomas de intoxicación o anafilaxia)

HISTAVET 2.5%, disminuye o evita los principales efectos de la histamina en el organismo, no previene su liberación ni su producción, pero antagoniza los efectos constrictores de la histamina en el músculo liso gastrointestinal, en los vasos grandes, en útero y bronquios, en los capilares, en el edema y en lesiones urticariantes.

A nivel de terminaciones nerviosas, antagoniza el efecto estimulante de la histamina que produce el dolor, el prurito, ardor (quemazón). A nivel de árbol bronquial, glándulas lacrimales y otras glándulas antagoniza el incremento de las secreciones.

HISTAVET 2,5%, después de su administración, su absorción es rápida y los efectos se pueden dar o aparecer entre 15 y 20 minutos, completándose en el lapso de una hora y pueden durar hasta 4 o 6 horas.

HISTAVET 2,5%, es metabolizado en el hígado y es excretado como metabolitos por la bilis y el riñón.

INDICACIONES: Indicado como antihistamínico, para enfermedad respiratoria alérgica o manifestaciones alérgicas de cualquier tipo. HISTAVET 2,5%, medicamento antihistamínico por su uso seguro y eficaz, se indica en todas aquellas afecciones originadas por una liberación excesiva de histamina y por destrucción grave de tejidos como:

- Estados de shock (anafiláctico, postoperatorio y postraumático).
- Sensibilización a fármacos y alimentos.
- Enfermedad respiratoria alérgica o manifestaciones alérgicas de cualquier tipo.
- Fotosensibilización.
- Dermatitis o dermatosis de origen alérgico.
- Coadyuvante en intoxicaciones por compuestos organofosforados.
- Toxemias debidas a toxinas bacterianas, parasitarias y tóxicos químicos.

Se recomienda su uso previo a las aplicaciones de biológicos. En todos los casos donde se evidencien reacciones anafilácticas, debe usarse HISTAVET 2,5% al tiempo y de manera continua hasta que los síntomas desaparezcan. El tratamiento se realiza durante 3 a 5 días, cada 8 a 12 horas.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular e intravenosa lenta. 1 mL por cada 25 kg. Bovinos, Equinos y Porcinos: 0,5 a 1 mg por kg de peso, en la práctica 2 a 4 mL por 100 kg de peso. Gatos y Perros: 1 a 2 mg por kg de peso, en la práctica 0,5 mL por 10 kg de peso.

ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO: Bovinos, equinos, porcinos, gatos y perros.

CONTRAINDICACIONES: Sensibilidad al medicamento.

PRECAUCIONES: No utilizar durante la gestación ni la lactancia. No administrar en equinos cuya carne o leche se destine al consumo humano.

TIEMPO DE RETIRO: No aplicar en animales destinados al consumo humano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar a temperatura inferior a 30°C resguardado de la luz. La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.



ANALGÉSICO ANTI-INFLAMATORIO