



LEVAMISOL 7,5%

Antiparasitarios

Reg. ICA 1791-DB

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contienen:
Levamisol Hcl 7,5 g
Excipientes C.S.P. 100 ml

USO EN: Bovinos, Ovinos y Porcinos.

INDICACIONES:

En bovinos y ovinos para el tratamiento de *Haemonchus sp.*, *Ostertagia sp.*, *Trichostrongylus sp.*, *Strongyloides sp.*, *Bunostomum sp.*, *Nematodirus sp.*, *Neoascaris sp.*, *Chabertia sp.*, *Cooperia sp.*, *Oesophagostomum sp.* y *Dicytycaulus sp.* En porcinos para el tratamiento de *Hyostrogylus sp.*, *Ascaris sp.*, *Oesophagostomum sp.* y *Metastrongylus sp.*

DOSIS:

PESO ANIMAL (Kg)	DOSIS (ml)
60	4
90	6
120	8
150	10
180	12
210	14

PRECAUCIONES:

No utilizarse en equinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular en bovinos, subcutánea en ovinos y porcinos.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 3 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:

Caja de 24 Frascos x 20 ml
Frascos por 20, 100, 250 y 500 ml



ANTIHELMÍNTICO