



**Nucherol® Polvo Controla Nuches, Ácaros de la Sarna, Piojos, Moscas, Pulgas y Parasitos Gastrointestinales.**



# NUCHEROL

**Ectoparasiticidas**

Reg. ICA 7555-MV

**COMPOSICIÓN:** Cada 100g contienen:  
 Metrifonato (Triclorfón) 97 g  
 (o, o - Dimetil-2, 2, 2-Tricloro-Hidroxetilfosfonato)  
 Excipientes C.S.P. 100 g

**INDICACIONES:**

**BOVINOS:** En el control de *Haemonchus placei*, *Ostertagia ostertagi*, *Cooperia* spp, *Trichostrongylus* spp, *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum radiatum*. Larvas de *Dermatobia hominis*, *Stomoxys calcitrans*, *Haematobia irritans*. Ácaros de la sarna: *Sarcoptes scabiei* var. *Bovis*, *Psoroptes bovis*, *Chorioptes bovis*, *Demodex folliculorum*, var. *Bovis* y piojos: *Damalinia bovis*, *Haematopinus euryster* *Oesophagostomum* spp. Larvas de *Oestrus ovis*. Ácaros de la sarna: *Sarcoptes scabiei* var. *ovis*. *Chorioptes ovis*. *Psoroptes ovis*, *Demodex* spp y piojo como: *Damalinia ovis*, *Linognathus stenopsis* y *Linognathus pedalis*. **EQUINOS:** *Parascaris equorum*, *Oxyuris equi*, y larvas de *Gasterophilus* spp Larvas de *Habronema* spp Ácaros de la sarna. *Sarcoptes scabiei* var. *equi*, *Psoroptes equi*, *Chorioptes equi* y piojos como: *Damalinia equi*. *Haematopinus asini*. **PORCINOS:** *Ascaris suum*, *Trichuris suis*, *Hyostromylus* spp, *Oesophagostomum* spp. Ácaros de la sarna: *Sarcoptes scabiei* var. *suis*, *Demodex folliculorum* y piojos *Haematopinus suis*. **AVES:** Ácaros de la sarna como *Dermanyssus avium*, *Dermanyssus gallinae* y *Cnemidoptes mutans* y piojos como *Menopon gallinae*.

**DOSIS:** Para: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y aves. **Aplicación externa (aspersión):** Piojos, ácaros de la sarna y moscas: 1 sobre de 15 g en 10 litros de agua (1,455 g/L Metrifonato-Triclorfón).

- Larvas (nuche, miasis, bichera): 1 sobre de 15 g en 1.5 litros de agua (9,7 g/L Metrifonato-Triclorfón).
  - Otras indicaciones según criterio del médico veterinario.
- Para: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos.
- Aplicación interna:** 1 sobre de 15 g en 150 mL de agua (97 mg/mL Metrifonato-Triclorfón), de esta solución, se administra 5 mL por cada 10 kg de peso vivo (48,5 mg/kg Metrifonato-Triclorfón) vía oral. Equinos: Administrar 3,5 mL de esta solución por cada 10 kg de peso (33,95 mg/kg Metrifonato-Triclorfón) vía oral.
- Para porcinos repetir dosis al mes en caso de presentar ectoparásitos. • Otras indicaciones según criterio del médico veterinario.

**ANTÍDOTO:** En los humanos, Sulfato de ATROPINA al 1%, a la dosificación de 0,2 ml (2 mg) vía intramuscular, cada hora, hasta que desaparezcan los síntomas.

**PRECAUCIONES:** Leer la etiqueta antes de usar el producto. En vacas de producción lechera, la aplicación del producto debe hacerse después del ordeño. No usar en hembras en el último tercio de la gestación, ni en animales débiles o fatigados y la dosis de la atropina en animales en caso de intoxicación, "según criterio del médico veterinario".

**TIEMPO DE RETIRO:** La leche producida durante el tratamiento y 12 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano. Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de finalizado al tratamiento.

**PRESENTACIÓN:**  
 Caja de 50 sobres x 15 g, Frasco x 200-1000 g.

