

**Anti-microbiano
inyectable de larga acción.**



PANAMICINA L.A.

Antimicrobiano

Reg. ICA 3510-DB



COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:

Oxitetraciclina dihidrato 200 mg
Excipientes C.S.P. 1 ml

USO EN:

Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Aves, Caninos y Gatos.

INDICACIONES:

En bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, caninos y gatos para el tratamiento de infecciones ocasionadas por: Anaplasma sp, Rickettsia sp, Escherichia coli, Pasteurella sp, Streptococcus sp, Haemophilus sp, Leptospira sp, Campylobacter sp, Listeria sp. y Pasteurella multocida.

POSOLOGÍA:

Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Caninos y Gatos	Aves
1 ml por cada 10 kg de peso vivo como dosis única.	50 mg / Kg (0,25 ml por Kg de peso vivo).

Máximo volumen por sitio de aplicación: En Bovinos y Equinos 10 ml. Ovinos, Caprinos y porcinos no superior a 5 ml.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. No usar el producto en vacas en producción de leche. No administrar a aves en producción de huevos destinados al consumo humano.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular. En lechones con pesos menores de 10 kg se recomienda la vía subcutánea (detrás de la oreja) a dosis de 1 ml. En aves vía subcutánea en la región posterior del cuello.

PRECAUCIÓN:

Las formulaciones L.A. (larga acción) de oxitetraciclina pueden ser muy irritantes en los equinos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:

Caja de 12 Frascos por 20 mL
Frascos de 50, 100, 250 y 500 ml

