




**Anabólico de
Acción Prolongada**



STROGEN-50

Anabólicos

Reg. ICA 3595-DB

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contienen:
Boldenona Undecilenato
(como Boldenona base 3,16 g) 5 g
Excipientes C.S.P. 100 ml

USO EN:
Bovinos, Equinos, Porcinos y Caninos.

INDICACIONES:
Anabólico coadyuvante en el tratamiento post-quirúrgico de intervenciones óseas y fracturas para acelerar la formación del callo óseo. Coadyuvante en el tratamiento de Osteomalacias, Osteoporosis, Anemia, Leucopenia y debilidad senil.

DOSIS:

Bovinos y Porcinos	Equinos	Caninos
1ml x c/90 kg PV	0,5 ml x c/45kg PV	0,25 ml x c/5 kg PV

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular.
Puede repetirse cada 2 - 4 semanas.

PRECAUCIONES:

No usar en animales preñados, ni en vacas en producción de leche, ni en caso de tumores malignos. La sobredosificación de este producto puede ocasionar efectos masculinizantes y aumento de la libido. La administración de este producto en animales jóvenes puede ocasionar osificación prematura, No utilizar en reproductores ni en animales jóvenes. No utilizar en animales con tumores andrógeno-dependientes. No utilizar en animales con diagnóstico de insuficiencia renal.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 30 días después de finalizado el tratamiento. No administrar en vacas en producción de leche para consumo humano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:

Frasco por 10, 50, 100, 250 y 500 ml.



ANABÓLICO