



# TRIMEBAC

Antimicrobiano

Reg. ICA 6512-MV

**COMPOSICIÓN:** Cada ml contiene:

Trimetoprim ..... 80 mg  
Sulfadiazina ..... 400 mg  
Excipientes C.S.P. .... 1 ml

**DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:**

Porcinos: 25 mg / 4 kpv, Aves: 25 mg de la asociación x 1kg día, adminístrese por 5 días consecutivos. En la práctica:

ESPECIE	EDAD	TRIMEBAC	TIEMPO
Aves: Pollos, Pavos	1 día de nacidas a 3 semanas	1 ml por cada 3 litros de agua	3 a 5 días
Pollonas Ponedoras	4 a 5 semanas	1 ml por 2.5 litros de agua	3 a 5 días
Cerdos:	Directamente en la boca	1 ml por cada 16 kg de peso o 10 ml por cada 15 litros de agua	3 a 5 días
		2 ml por 32 kg en una sola toma directamente en la boca	3 a 5 días

**INDICACIONES:**

En pollos, pollas de remplazo, pavos y cerdos para el tratamiento de infecciones causadas por: *Escherichia coli*, *Haemophilus gallinarum*, *Pasteurella s.p.*, *Streptococcus s.p.*, *Staphylococcus s.p.*

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Administrar vía oral (en el agua de bebida).

**PRECAUCIONES:**

No administrar en Aves en periodo de postura.

**TIEMPO DE RETIRO:**

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 5 días después de finalizado el tratamiento.

**PRESENTACIÓN:**

Caja de 12 goteros x 10 ml  
Frasco de 50, 100, 500 y 1000 ml.

