



MICOMIX 60% PORCÍCOLA

Antimicoplasmico

Reg. ICA 10988-MV

COMPOSICIÓN:

Cada 100g contienen:

Tiamulina Hidrógeno Fumarato 60,0 g
Excipientes c.s.p. 100 g

INDICACIONES Y USOS:

En Aves como pollos y pavos para el tratamiento de infecciones causadas por *Mycoplasma gallisepticum*, de artritis por *Mycoplasma sinoviae*, *Mycoplasma meleagridis*, *Mycoplasma hyorhinis*, *Mycoplasma anatis*, por bacterias *Staphylococcus aureus*, *Clostridium perfringens*.
En Cerdos para el tratamiento de Disentería porcina asociada a *Brachyspira hyodysenteriae* (Serpulina), Pleuropneumonia contagiosa causada por *Actinobacillus pleuropneumoniae* y neumonía enzoótica causada por *Mycoplasma hyopneumoniae* y *Haemophilus* sp, artritis micoplásmica, causada por *Mycoplasma hyosynoviae*, Ileítis causada por *Lawsonia Intracellularis*.

DOSIFICACIÓN:

Oral, se debe administrar en el agua de beber. La dosificación y duración de los tratamientos deben ser según criterio del Médico Veterinario.

Aves como pollos y pavos 25-50 mg /kg de peso vivo a suministrarse de acuerdo a criterio del Médico Veterinario.
Cerdos Neumonía Enzoótica 5-10 mg /kg de peso vivo
pleuroneumonía 10 mg /kg de peso vivo. Enteropatía proliferativa porcina (ileítis) 7.5 mg /kg de peso vivo.
Disentería porcina 7.7 mg /kg de peso vivo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PRECAUCIONES:

- No utilizar en especies diferentes al cerdo o ave.
- Durante el tratamiento no se debe administrar alimento que contenga anticoccidiales ionóforos como monensina, salinomicina y narasina para evitar efectos tóxicos severos.
- Evite el contacto directo con la piel y membranas mucosas, puede causar irritación.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 5 días después de finalizado el tratamiento. No administrar en aves en periodo de postura.

Medidas de protección que se deben utilizar en el proceso de preparación del Mycomix 60%:


Extracción localizada de aire en caso que el lugar no cuente con suficiente ventilación o exista exposición prolongada utilizar tapabocas para polvos o material particulado. Utilizar guantes y gafas de seguridad. Lavarse las manos y ducharse al terminar el trabajo y durante los descansos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

PRESENTACIÓN:

Bolsa de 500 g.



ANTIMICOPLASMICO