



MYCOMIX 20% PORCÍCOLA

Antimicoplasmico

Reg. ICA 8917-MV

COMPOSICIÓN: Cada 100g contienen:
Tiamulina Fumarato 20,0 g
Excipientes c.s.p. 100 g

INDICACIONES Y USOS:

En **Aves** como pollos y pavos para el tratamiento de infecciones causadas por *Mycoplasma gallisepticum*, de artritis por *Mycoplasma sinoviae*, *Mycoplasma meleagridis*, *Mycoplasma hyorhinis*, *Mycoplasma anatis*, por bacterias *Staphylococcus aureus*, *Clostridium perfringens*. En **Cerdos** para el tratamiento de Disentería porcina asociada a *Brachyspira hyodysenteriae* (Serpulina), Pleuropneumonia contagiosa causada por *Actinobacillus pleuropneumoniae* y neumonía enzoótica causada por *Mycoplasma hyopneumoniae* y *Haemophilus sp*, artritis micoplásmica, causada por *Mycoplasma hyosynoviae*, Ileititis causada por *Lawsonia Intracellularis*.

DOSIFICACIÓN:

Oral, se debe mezclar bien con el alimento antes de usarse. La dosificación y duración de los tratamientos deben ser según criterio del Médico Veterinario. Aves como pollos y pavos 25-50 mg THF/kg de peso vivo a suministrarse de acuerdo a criterio del Médico Veterinario. Cerdos Neumonía Enzoótica 5-10 mg THF/kg de peso vivo pleuroneumonía 10 mg THF/kg de peso vivo. Enteropatía proliferativa porcina (ileitis) 7.5 mg THF/kg de peso vivo. Disentería porcina 7.7 mg THF/kg de peso vivo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral en pre-mezcla con los alimentos

PRECAUCIONES:

- No administrar de forma directa a los animales.
- Almacenar a temperatura ambiente. No utilizar en especies diferentes al cerdo o ave.
- Durante el tratamiento no se debe administrar alimento que contenga anticoccidiales ionóforos como monensina, salinomocina y narasina para evitar efectos tóxicos severos.
- Evite el contacto directo con la piel y membranas mucosas, puede causar irritación.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 5 días después de finalizado el tratamiento. No administrar en aves en periodo de postura.

Medidas de protección que se deben utilizar en el proceso de mezcla del Mycomix 20% y el alimento: Extracción localizada de aire en caso que el lugar no cuente con suficiente ventilación o exista exposición prolongada utilizar tapabocas para polvos o material particulado. Utilizar guantes y gafas de seguridad. Lavarse las manos y ducharse al terminar el trabajo y durante los descansos.

PRESENTACIÓN

Bolsa de 5, 10 y 25 kg.



ANTIMICOPLASMICO