



NEOVET 50% PORCÍCOLA

Antibacterial

Reg. ICA 8522-MV

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La Neomicina es un antibiótico aminoglucósido bactericida activo frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas tales como: E.Coli, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae, Proteus vulgaris, Salmonella spp, Shigella spp, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Mycobacterium tuberculosis, Bacillus anthracis.

Los organismos anaerobios son resistentes. Las resistencias se desarrollan lentamente, siendo cruzada con la lincomicina y con los otros amino glucósidos.

COMPOSICIÓN Cada 100 g contienen:

Sulfato de Neomicina71.5 g
(equivalente a 50g de Neomicina Base)
Excipientes c.s.p.100 g

INDICACIONES

En Cerdos para el tratamiento de colibacilosis (Escherichia coli), Salmonelosis (Salmonella choleraesuis), Disentería vibrionica (Bachyspira hyodisenteriae), Ileitis infecciosa.

En Aves para el tratamiento y control de colibacilosis (enteritis bacteriana) causada por Escherichia coli.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

La dosis oral de 10 a 30 mg/kg de peso vivo.

En la practica: en el agua de ½ a 1 g por litro durante 5 a 7 días.

PRECAUCIONES

Evite el contacto directo de la piel y mucosas y la inhalación del producto.

Usar guantes y mascarilla durante la incorporación y manipulación de la premezcla.

No administrar en aves de postura cuyos huevos se destinen al consumo humano.

Mantener fuera del alcance de los niños.

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano 15 días después de finalizado el tratamiento.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Conservar en envase cerrado y lugar fresco, seco y protegido de la luz. En alimento actúa como protector y restaurador de la integridad de la mucosa, del tracto digestivo sucedida por el tránsito rápido, aumentando el tono de intestino.

PRESENTACIÓN 1Kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.



ANTIMICROBIANO