



TRISULMIX 90% PORCÍCOLA

Antibacterial

Reg. ICA 5322-DB

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Cada 100 g de TRISULMIX 90% contiene:

Sulfametazina sódica (equivalente a 69,5 g de Sulfametazina base)	75 g
Trimetoprim	15 g
Excipientes c.s.p.	100.0 g

INDICACIONES:

En aves: Indicado en pollos de engorde y pollas de levante para controlar y tratar enfermedades producidas por *Escherichia coli* (colibacilosis), *Avibacterium paragallinarum* (coriza infecciosa), *Streptococcus sp.*, *Staphylococcus sp.*, *Klebsiella sp.*, *Shigella sp.*, *Pasteurella sp.* (colera aviar).

En cerdos: Indicado para controlar y tratar la enfermedad producida por *Bordetella sp.*, *Escherichia coli*, *Shigella sp.*, *Actinobacillus sp.*, *Pasteurella sp.*, *Corynebacterium sp.*, *Trueperella pyogenes*, *Actinomyces sp.*, *Campylobacter sp.*, *Streptococcus sp.*, *Proteus sp.*, *Staphylococcus sp.*, *Klebsiella sp.*, *Bordetella sp.*, *Haemophilus sp.*, *Glaesserella parasuis*.

ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO: Aves y cerdos.

DOSIS VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Dosis farmacológica: Para uso en agua de bebida o en el alimento a razón de 25 mg/kg de Sulfametazina sódica y 5 mg/kg de Trimetoprim de 4 a 7 días dependiendo del criterio del médico veterinario.

Dosis práctica: Para agua de bebida en la práctica disolver 140 g de producto en un tanque de 1.000 L de agua. Si se va a preparar junto con el alimento mezclar 700 g de producto para 1 tonelada de alimento.

RECOMENDACIONES PARA EL USO:

• En aves y cerdos debe administrarse en el agua de bebida o en el alimento. • Preparar diariamente soluciones frescas y suministrar como única fuente de bebida.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

• Su uso no se recomienda durante la gestación y lactancia, puesto que no se ha demostrado su seguridad durante estos periodos. • Destruya el empaque después de administrar el producto. • Evite el contacto con los ojos, mucosas y piel, en caso de contacto, lavar con abundante agua y jabón. • El consumo de alimento o agua de bebida depende de la condición fisiológica y clínica del paciente, así como de la etapa productiva en la que se encuentra, para realizar correctamente el cálculo de la dosificación. • Se recomienda realizar pruebas de sensibilidad de las cepas presentes en la explotación mediante cultivo/antibiograma, previo a la administración del producto.

TIEMPO DE RETIRO:

Las aves tratadas destinadas al consumo humano deberán sacrificarse solo después de 10 días finalizado el tratamiento, no se debe administrar el producto a aves ponedoras en producción de huevo para el consumo humano, ni en las 4 semanas anteriores al inicio del periodo de postura. Los cerdos tratados destinados al consumo humano deberán sacrificarse solo después de 15 días finalizado el tratamiento.

CONTRAINDICACIONES:

• No usar en animales con disfunción hepática o renal grave. • No usar en casos de hipersensibilidad conocida a los principios activos o excipientes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura inferior a 30°C resguardado de la luz. La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

No administrar con anticoagulantes, con acidificantes urinarios o con otros medicamentos veterinarios.

PRESENTACIÓN

5 kg, 10kg, 25 kg.



ANTIMICROBIANO